

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kemampuan adaptasi pada enam varietas lokal bawang putih yang diuji (Lumbu Putih, Lumbu Hijau, Lumbu Kuning, Tawamangu Baru, Sangga Sambalun dan Jangkiriah Adro) ternyata menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik di dataran rendah Muaro Jambi untuk karakter pertumbuhan diameter batang semu, jumlah daun, persentasi hidup dan diameter umbi, namun semua varietas memiliki ukuran tinggi tanaman dan jumlah suing per umbi yang masih rendah (dibawah 50% dari kondisi deskripsi tanaman pada habitat aslinya dataran tinggi).
2. Varietas Lumbu Putih dan Sangga Sambalun mampu tumbuh, berumbi dan memiliki jumlah suing per umbi yang lebih tinggi dari varietas Lumbu Kuning dan Jangkiriah Adro di dataran rendah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

5.2. Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjut pada 2 (dua) varietas lumbu putih dan sangga sambalun untuk perkembangan umbi dan suing dengan menggunakan berbagai teknik budidaya bawang putih dataran rendah.