

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Teknik operasi kastrasi yang digunakan adalah teknik operasi terbuka. Tindakan pembedahan dilakukan dengan membuat sayatan pada scrotum (testis) dan kemudian mengeluarkan dan memotong testis serta mengikat saluran yang ada. Pada kastrasi sayatan dibuat kecil dan dijahit karena akan dengan mudah menutup sendiri. Proses pembedahan tidak berlangsung lama namun efek pembiusan baru akan hilang setelah beberapa jam, tetapi dalam hal ini dokter memberikan obat untuk menghilangkan efek bius kucing tersebut yaitu dengan obat reverezine di injeksi kan secara intravena, setelah sadar kucing masih akan nampak sempoyongan dan belum mau makan minum. Tergantung individu, biasanya 24 – 48 jam setelah pembedahan kucing sudah mulai mau makan secara bertahap. Untuk perawatan nya pasca pembedahan bisa dilakukan selama 5-7 hari terhadap lukanya sendiri tidak perlu perlakuan khusus karena akan sembuh sendiri.

Kucing dalam perawatan pasca operasi setelah diberi antibiotik dan vitamin serta antiradang dalam waktu 7 hari dapat sembuh karena antibiotik dapat mencegah kerusakan kulit lebih lanjut, mengurangi resiko infeksi dan meningkatkan kenyamanan pasien serta dengan manajemen pemberian nutrisi yang baik.

5.2 Saran

Sebaiknya dalam pemeliharaan hewan dalam kondisi pasca operasi seperti kucing lebih diperhatikan beberapa faktor seperti berikut: 1. Kebersihan kandang dan hewan. 2. Pemberian nutrisi yang baik. 3. Hindari hal-hal yang dapat menyebabkan perlukaan pada area operasi.