

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas pasien adalah perempuan , berusia 15–65 tahun, memiliki tingkat pendidikan tinggi, dan bekerja. Penyakit terbanyak yang memerlukan terapi antibiotik adalah nasofaringitis dan abses kulit, furunkel, dan karbunkel.
2. Antibiotik yang paling banyak dipakai adalah amoksisilin kotrimoksazol, siprofloksasin, eritromisin, dan kloramfenikol .
3. Penggunaan antibiotik yang dinilai tepat yang termasuk kategori 0 hanya 15,84%
4. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat yang paling banyak adalah kategori IIIb. Ketidaktepatan durasi ini disebabkan oleh pemberian antibiotik yang hanya dapat dinilai berdasarkan satu kali pengobatan.

#### **1.2 Saran**

Penelitian tentang evaluasi penggunaan antibiotik menggunakan metode Gyssens harus diperbanyak dipuskesmas-puskesmas Provinsi Jambi agar dapat mengetahui penggunaan antibiotik secara tepat di Provinsi Jambi serta untuk menghindari resistensi antimikroba.