

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanaman *repellent* kenikir memiliki pengaruh yang besar [$d = 1,169$] terhadap kelimpahan *Thrips parvispinus* pada tanaman cabai rawit di Desa Solok Kabupaten Muaro Jambi.

5.2 Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi dalam penuntun praktikum mata kuliah Entomologi dengan pada materi pengendalian hayati.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah untuk penelitian serupa maupun penelitian lanjutan mengenai pengaruh tanaman *repellent* kenikir terhadap kelimpahan *Thrips .parvispinus* pada tanaman cabai rawit maupun tanaman sayur lainnya.

5.2 Saran

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu strategi dalam mengendalikan hama *Thrips parvispinus* pada tanaman hortikultura.
2. Disarankan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas tanaman kenikir sebagai pengendalian hama *Thrips parvispinus* dengan pembuatan ekstrak sebagai pestisida nabati ataupun penggunaan tanaman *repellent* kenikir terhadap kelimpahan serangga hama yang lain.