

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini efek samping yang paling sering dialami pada pasien tuberkulosis resisten obat yang menjalankan pengobatan menggunakan BPaL dan BPaLM di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi selama 6 bulan pengobatan yaitu Gangguan Gastrointestinal sebanyak 16 pasien (84,2%) dan yang paling jarang adalah Gangguan Ginjal sebanyak 1 pasien (5,3%)
2. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pasien tuberkulosis resisten obat yang menjalankan pengobatan menggunakan BPaL dan BPaLM di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagian besar dengan tidak memiliki riwayat tuberkulosis sebelumnya atau kasus baru yaitu sebanyak 11 pasien (57,9%)

5.2 Saran

Dari seluruh proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini maka dapat diajukan saran :

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di Rumah Sakit rujukan lainnya sehingga sampel yang didapatkan lebih banyak agar penelitian tersebut lebih valid.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan hubungan antara tiap variabel dengan efek samping yang di alami oleh tiap pasien
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mendapatkan data pemeriksaan penunjang yang lebih lengkap agar dapat menilai Gangguan lainnya seperti Gangguan Jantung, Gangguan Elektrolit, Gangguan Endokrin, Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran.
4. Pada populasi untuk selalu patuh terhadap pengobatan, rutin kontrol ke fasilitas kesehatan, menggunakan masker serta menjaga pola hidup yang sehat.