

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Gambaran klinis dari ayam yang terindikasi colibacillosis dari hasil seleksi (pisahkan) berbeda-beda tergantung pada umur ayam. Dari hasil pemeriksaan dan proses nekropsi yang telah dilakukan ditemukan gejala klinis dari 8 ekor ayam yang diambil setiap harinya hingga 35 hari yaitu omphalitis yang terjadi pada umur 1-15 hari, tulang keropos pada umur 1-15 hari, pericarditis pada umur 9-15 hari, perihepatitis pada umur 11-35 hari, dan airsacculitiis pada umur 11-35 hari.

5.2 Saran

Kasus penyakit colibacillosis banyak menyerang ayam muda tetapi ayam tua juga bisa terkena penyakit colibacillosis ini. Maka, pencegahan harus diperketat guna mencegah bakteri *Escherichia coli* berkembang biak didalam kandang, manajemen kandang juga perlu dipantau setiap saat, dan tindakan harus dilakukan ketika terlihat ada yang terkena penyakit ini guna memutus rantai penyebarannya, oleh karena itu kesadaran dan ketelitian serta kekompakan petugas kandang sangat diperlukan untuk keberhasilan proses pemeliharaan bebas dari colibacillosis.