

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa kombinasi hijauan dan UMB, terutama dengan tambahan tepung kunyit dosis terbatas (3 hari), dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengendalian infestasi cacing pada ternak ruminansia. Namun demikian, perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis optimal kunyit serta lama pemberiannya agar diperoleh hasil yang maksimal, tanpa menimbulkan efek samping negatif pada ternak.

Pemberian hijauan segar, hijauan + UMB, dan kombinasi hijauan + UMB + kunyit tidak mengubah jenis telur cacing yang dikeluarkan oleh kambing PE. Jenis telur cacing yang tetap sama pada semua perlakuan mengindikasikan bahwa perlakuan pakan pada dosis dan waktu pemberian yang digunakan belum efektif menekan keberadaan cacing di dalam tubuh kambing.

5.2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan kunyit dalam bentuk ekstrak, dosis yang lebih tinggi, serta periode pemberian yang lebih lama. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi sanitasi kandang dan pengendalian pakan hijauan sebagai upaya pencegahan infestasi ulang.